

# Einführung in die Stochastik für Studierende der Informatik

## Lösung Aufg. 12, 14, 17

### Aufgabe 12

(i) Es ist  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup A_n := \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} A_m$  definiert.

Zu zeigen:  $\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} A_m \stackrel{!}{=} \{\omega \in \Omega \mid \omega \text{ liegt in unendlich vielen der } A_n\}$   
 $(= \{\omega \in \Omega \mid \forall n \in \mathbb{N} \exists m_0 \geq n \text{ mit } \omega \in A_{m_0}\}).$

“ $\subseteq$ “: Es sei  $\hat{\omega} \in \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} A_m$ , d.h.  $\hat{\omega} \in \bigcup_{m=n}^{\infty} A_m \forall n \in \mathbb{N}$ .  
 $\implies \forall n \in \mathbb{N} \exists m_0 \geq n \text{ mit } \hat{\omega} \in A_{m_0},$   
 also  $\hat{\omega} \in \{\omega \in \Omega \mid \forall n \in \mathbb{N} \exists m_0 \geq n \text{ mit } \omega \in A_{m_0}\}.$

“ $\supseteq$ “: Es sei  $\hat{\omega} \in \{\omega \in \Omega \mid \omega \text{ liegt in unendlich vielen der } A_n\},$   
 d.h.  $\forall n \in \mathbb{N} \exists m_0 \geq n \text{ mit } \hat{\omega} \in A_{m_0}.$   
 $\implies \hat{\omega} \in \bigcup_{m=n}^{\infty} A_m \forall n \in \mathbb{N} \implies \hat{\omega} \in \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} A_m.$

(ii) Es ist  $\lim_{n \rightarrow \infty} \inf A_n := \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{m=n}^{\infty} A_m$  definiert.

Zu zeigen:  $\bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{m=n}^{\infty} A_m = \{\omega \in \Omega \mid \omega \text{ liegt in allen außer endlich vielen der } A_n\}$   
 $(= \{\omega \in \Omega \mid \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ mit } \omega \in A_m \forall m \geq n_0\}).$

“ $\subseteq$ “: Es sei  $\hat{\omega} \in \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{m=n}^{\infty} A_m$ , d.h.  $\exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ mit } \hat{\omega} \in \bigcap_{m=n_0}^{\infty} A_m.$   
 $\implies \hat{\omega} \in A_m \forall m \geq n_0,$   
 also  $\hat{\omega} \in \{\omega \in \Omega \mid \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ mit } \omega \in A_m \forall m \geq n_0\}.$

“ $\supseteq$ “: Es sei  $\hat{\omega} \in \{\omega \in \Omega \mid \omega \text{ liegt in allen außer endlich vielen der } A_n\},$   
 d.h.  $\exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ mit } \hat{\omega} \in A_m \forall m \geq n_0.$   
 $\implies \hat{\omega} \in \bigcap_{m=n_0}^{\infty} A_m \implies \hat{\omega} \in \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{m=n}^{\infty} A_m.$

### Aufgabe 14

Gebe der Form halber den Wahrscheinlichkeitsraum an:

$\Omega := \{(u, \omega_1, \dots, \omega_{m+1}) \mid u \in \{0, \dots, N\}, \omega_i \in \{0, 1\}, i \in \{1, \dots, m+1\}\},$  wobei  $0 \hat{=}$  weiß und  $1 \hat{=}$  schwarz.

$$P(\{(u, \omega_1, \dots, \omega_{m+1})\}) := \frac{1}{N+1} \cdot \prod_{j=1}^{m+1} \left(\frac{u}{N}\right)^{\omega_j} \cdot \left(1 - \frac{u}{N}\right)^{1-\omega_j} \quad \forall \omega \in \Omega.$$

a) Betrachte:

$A := \{(u, \omega_1, \dots, \omega_{m+1}) \in \Omega \mid \omega_1 = \dots = \omega_m = 1\} \hat{=} \text{„}m\text{-mal schwarz bei den ersten } m \text{ Ziehungen“},$

$B := \{(u, \omega_1, \dots, \omega_{m+1}) \in \Omega \mid \omega_{m+1} = 1\} \hat{=} \text{„schwarz im } (m+1)\text{-ten Zug“},$

$H_i := \{(u, \omega_1, \dots, \omega_{m+1}) \in \Omega \mid u = i\}, \quad i \in \{0, \dots, N\} \hat{=} \text{„Wahl der Urne } i\text{“}.$

Gesucht:  $P(B \mid A)$ .

Zunächst Berechnung von  $P(A \cap B)$ .

Es ist:  $P(H_i) = \frac{1}{N+1}$ ,  $i \in \{0, \dots, N\}$  und  $P(A \cap B \mid H_i) = (\frac{i}{N})^{m+1}$  (siehe Def. von  $P$ ).

Mit der Formel von der totalen Wahrscheinlichkeit:

$$P(A \cap B) = \sum_{i=0}^N P(A \cap B \mid H_i) \cdot P(H_i) = \sum_{i=0}^N (\frac{i}{N})^{m+1} \cdot \frac{1}{N+1}.$$

Analog:

$$P(A) = \sum_{i=0}^N P(A \mid H_i) \cdot P(H_i) = \sum_{i=0}^N (\frac{i}{N})^m \cdot \frac{1}{N+1}.$$

Damit:

$$P(B \mid A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{(\frac{1}{N})^{m+1} \cdot \sum_{i=0}^N i^{m+1} \cdot \frac{1}{N+1}}{(\frac{1}{N})^m \cdot \sum_{i=0}^N i^m \cdot \frac{1}{N+1}} = \frac{1}{N} \cdot \frac{\sum_{i=1}^N i^{m+1}}{\sum_{i=1}^N i^m} = p_N^*.$$

b) Es gilt (da  $x^m$  streng monoton wachsend auf  $[0, \infty)$ ):

$$\frac{N^{m+1}}{m+1} = \int_0^N x^m dx < \sum_{i=0}^N i^m < \int_0^{N+1} x^m dx = \frac{(N+1)^{m+1}}{m+1}.$$

Also:

$$\frac{\frac{N^{m+1}}{m+2}}{\frac{(N+1)^{m+1}}{m+1}} < \frac{1}{N} \cdot \frac{\sum_{i=1}^N i^{m+1}}{\sum_{i=1}^N i^m} < \frac{\frac{(N+1)^{m+2}}{m+2}}{\frac{N^{m+2}}{m+1}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{m+1}{m+2} \cdot (\frac{N}{N+1})^{m+1} < p_N^* < \frac{m+1}{m+2} \cdot (\frac{N+1}{N})^{m+2}.$$

Für  $N \rightarrow \infty$  gilt also:  $p_N^* \rightarrow \frac{m+1}{m+2}$ .

## Aufgabe 17

Wir betrachten den Laplace-Raum

$$\Omega := \{(\omega_1, \omega_2) \mid \omega_1, \omega_2 \in \{1, \dots, 6\}\}$$

mit

$$P(\omega) := \frac{1}{36} \quad \forall \omega \in \Omega.$$

(a) Es sei

$$A_k := \{(k, \omega_2) \mid \omega_2 \in \{1, \dots, 6\}\} \hat{=} \text{„Erster Wurf ist gleich } k\text{“} \quad \forall k \in \{1, \dots, 6\}.$$

Dann gilt:

$$P(A_k) = \frac{1}{6} \quad \forall k \in \{1, \dots, 6\}.$$

Ferner ist

$$\begin{aligned} S &:= \{(1, 2)(2, 1)(1, 5)(2, 4)(3, 3)(4, 2)(5, 1)(3, 6)(4, 5)(5, 4)(6, 3)(6, 6)\} \\ &\hat{=} \text{„Summe ist durch drei teilbar“} \end{aligned}$$

mit

$$P(S) = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}.$$

Es gilt:

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap S) &= P(\{(1, 2)(1, 5)\}) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{3} = P(A_1)P(S), \\ P(A_2 \cap S) &= P(\{(2, 1)(2, 4)\}) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{3} = P(A_2)P(S), \\ P(A_3 \cap S) &= P(\{(3, 3)(3, 6)\}) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{3} = P(A_3)P(S), \\ P(A_4 \cap S) &= P(\{(4, 2)(4, 5)\}) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{3} = P(A_4)P(S), \\ P(A_5 \cap S) &= P(\{(5, 1)(5, 4)\}) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{3} = P(A_5)P(S), \\ P(A_6 \cap S) &= P(\{(6, 3)(6, 6)\}) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{3} = P(A_6)P(S). \end{aligned}$$

Also sind  $A_k$  und  $S$  stochastisch unabhängig für alle  $k \in \{1, \dots, 6\}$ .

(b) Betrachte

$$\begin{aligned} T &:= \{(1, 3)(1, 6)(2, 3)(2, 6)(3, 1)(3, 2)(3, 3)(3, 4)(3, 5)(3, 6) \\ &\quad (4, 3)(4, 6)(5, 3)(5, 6)(6, 1)(6, 2)(6, 3)(6, 4)(6, 5)(6, 6)\} \\ &\hat{=} \text{„Produkt ist durch drei teilbar“} \end{aligned}$$

mit

$$P(T) = \frac{20}{36} = \frac{5}{9}.$$

Es gilt:

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap T) &= P(\{(1, 3), (1, 6)\}) \\ &= \frac{1}{18} \neq \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{9} = P(A_1) \cdot P(T), \\ P(A_2 \cap T) &= P(\{(2, 3), (2, 6)\}) \\ &= \frac{1}{18} \neq \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{9} = P(A_2) \cdot P(T), \\ P(A_3 \cap T) &= P(\{(3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6)\}) \\ &= \frac{1}{6} \neq \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{9} = P(A_3) \cdot P(T), \\ P(A_4 \cap T) &= P(\{(4, 3), (4, 6)\}) \\ &= \frac{1}{18} \neq \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{9} = P(A_4) \cdot P(T), \\ P(A_5 \cap T) &= P(\{(5, 3), (5, 6)\}) \\ &= \frac{1}{18} \neq \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{9} = P(A_5) \cdot P(T), \\ P(A_6 \cap T) &= P(\{(6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)\}) \\ &= \frac{1}{6} \neq \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{9} = P(A_6) \cdot P(T). \end{aligned}$$

Also sind  $A_k$  und  $T$  für kein  $k \in \{1, \dots, 6\}$  stochastisch unabhängig.